

## **Procedimiento: Liposucción o Lipectomia**

### **Medidas generales.**

Debe deambular cada 2 horas con la ayuda de alguien. No debe permanecer acostado. Mas del reposo de una persona no operada. Debe cambiar el pañal de los drenajes cada 2 horas. Debe permanecer todo el tiempo con la faja y las espumas. No debe ingerir lácteos ni grasas durante los primeros días después de la cirugía para evitar el vómito. No debe hacer dieta. Debe consumir alimentos ricos en proteínas: carne, pollo, pescado, mariscos. El aseo diario los primeros tres día debe ser supervisado. No deambule solitario. Si su cirugía es lipectomía **NO DEBE MOJAR EL OMBLIGO.**

El primer control se realiza a las 48h, los siguientes controles se indican de acuerdo a su evolución. El inicio del postoperatorio (masajes, ultrasonido ) también será indicado por los médicos. Si tiene uno de estos signos debe comunicarse inmediatamente con nosotros: sensación de ahogo, sensación de dolor en las piernas como picada, sensación de liquido en la piel o "bolsa en la piel", dolor abdominal tipo picada asociado a vomito, ausencia de gases intestinales, distensión abdominal, estreñimiento mayor de 2 días, aparición de enrojecimiento, ampollas en la piel, fiebre mayor de 38,5 grados centígrados o pérdida de alguno de los drenes. Recuerde que debe drenar abundantemente, los pañales deben cambiarse cada 4 horas los tres primeros días.

**Cualquier inquietud que tenga por favor comunicarse con nosotros a los teléfonos 213 6131 , o a el celular: 318 281 76 52**



## Levantamiento de cola de ceja

□ ; \$ \$ -# 2 7 # #0 #- 9 2 ' - !\* 2  
# 7 # 80 # # 3- 9 2 # 0- 2 - 0 %!